

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا خرداد ماه ۱۳۹۹

نام عمومی	نام تجاری	درصد	فرمولاسیون	شرکت	بیماری	محصول	کارنس	دوز مصرف	تاریخ ثبت
آپکسی کونازول+تیوفانات متیل	رکس دو	%۴۹/۷	SC	ب آ اس اف	بیماری فوزاریمی سنبله	گندم	روز ۴۲	۰/۵ لیتر در هکtar	۹۲/۳/۲۷
آپکسی کونازول+تیوفانات متیل	رکس دو	%۴۹/۷	SC	ب آ اس اف	زنگ رزد	گندم	روز ۴۲	۰/۵ لیتر در هکtar	۹۶/۶/۲۷
آپکسی کونازول+تیوفانات متیل	رکس دو	%۴۹/۷	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	چغندر قند		۰/۵ لیتر در هکtar	۹۷/۷/۱۶
آزوکسی استروبین + دیفنو کونازول	ارتیواتاپ	%۳۲/۵	SC	سینجنتا	سفیدک پودری	جالیز- مزرعه. گلخانه	روز ۲	مزرعه: یک لیتر در هکtar گلخانه: ۷۵/۰ در هزار روز ۲	۸۸/۹/۳۰
آزوکسی استروبین + دیفنو کونازول	سفیر	%۳۲/۵	SC	بارزگانان سرای سپند	سفیدک پودری	خیار گلخانه	-	۰/۷۵ در هزار حداکثر دو بار سمپاشی	۹۷/۷/۱۶
آزوکسی استروبین + دیفنو کونازول	دیفوروبین	%۳۲/۵	SC	کاوش کیمیای کرمان	سفیدک پودری	خیار گلخانه	-	۰/۷۵ در هزار حداکثر دو بار سمپاشی	۹۷/۷/۱۶

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا خرداد ماه ۱۳۹۹

۹۲/۸/۲۷	۰/۷۵ لیتر در هکتار	۳۵ روز	گندم	زنگ زرد	سینجنتا	SC	%۲۸	آمیستاراکسترا	آزوکسی استروبین + سیپروکونازول	۵
۹۲/۸/۲۷	۰/۶ لیتر در هکتار	۳۰ روز	گندم	زنگ زرد	بايرا آ گ	EC	%۴۶	فالکن	اسپیروکسامین + تبو کونازول + تریادیمنول	۶
۹۴/۳/۲۵	۰/۷-۰/۸ لیتر در هکتار	۳۰ روز	گندم	فوزاریوم سنبله	بايرا آ گ	EC	%۴۶	فالکن	اسپیروکسامین + تبو کونازول + تریادیمنول	
۹۴/۶/۲۳	۳ کیلو گرم در هکتار	۵ روز	خیار	سفیدک داخلی	اگریا	WP	% ۴۳/۹۵	کوبروسیت سی	اکسی کلرور مس + سیمو کسانیل	۷
۹۱/۶/۲۰	۱ در هزار	۱۵ روز	درختان میوه دانه دار	آتشک	نوردوکس آ.اس نروژ	WG	%۷۵	نوردوکس	اکسید مس	۸
۹۰/۴/۱۳	۲/۵ در هزار	۱۵ روز	هلو	پیچیدگی برگ	نوردوکس آ.اس نروژ	WG	%۷۵	نوردوکس	اکسید مس	
۹۴/۷/۶	۱ کیلوگرم در هکتار	۱۵ روز	سیب زمینی	سفیدک داخلی	نوردوکس آ.اس نروژ	WG	%۷۵	نوردوکس	اکسید مس	
۹۶/۴/۱۹	۱۳۰ گرم برای یکصد کیلوگرم بذر	-----	برنج	پوسیدگی طوفه و ریشه برنج	نوردوکس آ.اس نروژ	WG	%۷۵	نوردوکس	اکسید مس	
۹۷/۱۰/۱۷	۰/۰ در هزار استفاده بیش از دو نوبت متوالی و بیش از چهار نوبت در یک دوره تولید منعو است.	۱ روز	خیار(فضای باز و گلخانه)	سفیدک کرکی	ب آ اس اف	SC	%۵۲/۵	اوروگو	آمتوکترادین + دیمتومورف	۹

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا خرداد ماه ۱۳۹۹

۹۹/۲/۸	۰/۷ در هزار در فواصل زمانی ۱۰-۷ روز جهت کنترل بیماری		هندوانه	سفیدک کرکی	ب آ اس اف	SC	%۵۲/۵	اوروگو	آموتوکترادین + دیمتومورف	
۸۶/۱۰/۱۰	٪۲ وزن غده	-----	سیب زمینی	شانکر ریزو کتونیابی ساقه و شوره سیاه غده	باير آگ	WP	%۵۰	رورال	ایپرودیون	۱۰
۹۶/۳/۱	۱/۲۵ لیتر در هکتار	۱۴ روز	برنج	بلاست	نیهون نوهیاکو	EC	%۴۰	فوجی وان	ایزوپروتیولون	۱۱
۹۲/۴/۱۷	۰/۷۵ کیلوگرم در هکتار	۱ روز	خیار	سفیدک پودری	نیپون سودا	WP	%۴۰	بلکیوت	ایمنو کتادین تریس	۱۲
۹۳/۳/۱۲	۷۵۰ گرم در هکتار	۷ روز	سیب زمینی	لکه موجی (آلترناریا)	نیپون سودا	WP	%۴۰	بلیکوت	ایمنو کتادین تریس	
۹۵/۸/۲۴	۰/۷۵ در هزار	۷ روز	انگور	سفیدک پودری	نیپون سودا	WP	%۴۰	بلیکوت	ایمنو کتادین تریس	
۹۳/۱۲/۴	۱۰ در هزار دو مرحله	۷ روز	زردآلو	بیماری غربالی	سیبز آور پردیس	SC	%۱۸	میشو بردوکس	بردو	۱۳
۹۴/۱۰/۷	۲ درصد محلول پاشی توأم با پانسمان شانکر با بردو کیمیا ۸ درصد	۷ روز	درخت سیب	شانکر سیتوسپیرایی	کاوش کیمیا کرمان	SC	%۱۸	بردو کیمیا	بردو	۱۴
۹۶/۱۱/۱۶	۱۰ در هزار	۷ روز	زردآلو	غربالی	البرز بهسهم	SC	%۱۸	بردو بهسهم	بردو	۱۵

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا خرداد ماه ۱۳۹۹

۹۶/۲/۲۵	۸ در هزار در مرحله جوانه و ۵ در هزار در مرحله ۵ درصد، درصد و ۱۰۰ درصد گل	روز ۷	درختان میوه دانه دار	آتشک	سبزآور نگین فلات	SC	%۱۸	بردوسیف	بردو	۱۶
۹۷/۹/۲۶	۵ در هزار		خیار(گلخانه)	سفیدک کرکی	سبزآور نگین فلات	SC	%۱۸	بردوسیف		
۹۸/۳/۲۷	۸ در هزار		هلو	پیچیدگی برگ	سبزآور نگین فلات	SC	%۱۸	بردوسیف		
۹۶/۳/۱	۸-۵ در هزار در زمان ریزش برگها در پاییز و تورم جوانه ها در بهار	روز ۷	هلو	پیچیدگی برگ	سمیران	SC	%۲۰	بردو سمیران	بردو	۱۷
۹۷/۹/۲۶	۵ در هزار	-	خیار(گلخانه)	سفیدک کرکی	اکسین شیمی آدان	SC	%۲۰	بردوکسین	بردو	۱۸
۹۷/۹/۲۶	۵ در هزار	-	خیار(گلخانه)	سفیدک کرکی	پرتونار	SC	%۲۰	بردوتکس	بردو	۱۹
۹۸/۳/۲۷	۹ در هزار	-	هلو	پیچیدگی برگ	پرتونار	SC	%۲۰	بردوتکس		
۹۷/۳/۲۸	۵ در هزار	روز ۷	گوجه فرنگی	سفیدک کرکی	باغبان تاک	SC	%۱۸	بردوفیکس	بردو	۲۰
۹۷/۸/۱۴	۱۰ در هزار در مرحله جوانه و ۴ در هزار در مراحا، ۵ در و ۱۰۰ درصد گل	روز ۷	دانه دار	آتشک درختان میوه	باغبان تاک	SC	%۱۸	بردوفیکس		

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا خرداد ماه ۱۳۹۹

۹۸/۳/۲۷	۲/۵ در هزار	-	انگور	سفیدک سطحی	باغبان تاک	SC	٪۸۰	سولفیکس		
۹۸/۳/۲۷	۱۰ در هزار	-	هلو	پیچیدگی برگ	باغبان تاک	SC	٪۱۸	بردو فیکس		
۹۷/۹/۲۶	۵ در هزار	-	خیار(گلخانه)	سفیدک کرکی	باغبان تاک	SC	٪۱۸	بردو فیکس		
۹۷/۱۲/۱۳	۹ در هزار	-	زردآلو	غربالی	گیاه	SC	٪۲۰	بردو جی	بردو	۲۱
۸۹/۹/۲۹	۰/۷ در هزار مناطق خشک، ۱ در هزار مناطق مرطوب	۷ روز	هلو- شلیل	سفیدک سطحی	ب آ اس اف	WG	٪۳۸	بلیس	بوسکالید+ پیراکلواستروبین	۲۲
۹۷/۱۲/۱۳	۰/۷ در هزار و در تناوب با سایر قارچ- کشها و حداکثر دوبار در سال	-	سیب درختی	سفیدک پودری	ب آ اس اف	WG	٪۳۸	بلیس	بوسکالید+ پیراکلواستروبین	۲۳
۹۴/۱۲/۱۰	۰/۵ کیلوگرم در هکتار	۳ روز	پودری گوجه فرنگی	آلناریا	ب آ اس اف	WG	٪۳۳/۴	سیگنوم		۲۴
۹۵/۳/۱۷	۰/۵ کیلوگرم در هکتار	۳ روز	سیب زمینی	آلناریا	ب آ اس اف	WG	٪۳۳/۴	سیگنوم	بوسکالید+ پیراکلواستروبین	
۹۸/۱۱/۲۸	۱/۵ در هزار و در تناوب با سایر قارچ- کشها و حداکثر دوبار در سال	۳ روز	توت فرنگی گلخانه	کپک خاکستری	ب آ اس اف	WG	٪۳۳/۴	سیگنوم		

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا خرداد ماه ۱۳۹۹

۹۹/۳/۱۲	۱/۵ کیلو گرم در هکتار حداقل دو مرحله و با رعایت فاصله ۱۴ روز تا برداشت استفاده شود.	۳ روز	کاهو	افتدادگی برگ	ب آ اس اف	WG	%۳۳/۴	سیگنوم		
۸۹/۹/۲۹	۰/۵ در هزار	۷ روز	هلو- شلیل	سفیدک پودری	ب آ اس اف	SC	%۳۰	کولیس	بوسکالید+ کرزوكسیم متیل	۲۵
۹۶/۹/۱۳	۰/۴ در هزار	-	خیار	سفیدک پودری	ب آ اس اف	SC	۳۰٪	کولیس	بوسکالید+ کرزوكسیم متیل	
۹۸/۴/۱۰	۰/۵ در هزار	-	گوجه فرنگی (فضای باز)	سفیدک پودری	ب آ اس اف	SC	۳۰٪	کولیس	بوسکالید+ کرزوكسیم متیل	
۹۰/۱۲/۱	۵ در هزار	-	جالیز- گلخانه	سفیدک پودری	کیمیاسبز آور	SP	%۸۵	کالیبان	بی کربنات پتاسیم	۲۶
۹۷/۱۲/۱۳	یک لیتر در هکتار	-	گندم	زنگ زرد	بهاورشیمی(استک)	EC	%۲۵	بهتیل	پروپیکونازول	۲۷
۸۹/۳/۱۰	۱۵-۱۰ میلی- لیتر برای یکصد کیلو گرم بذر	-	گندم	سیاهک پنهان معمولی	بایرا آ گ	FS	%۴۰	لاماردور	پروتیوکونازول + تبوکونازول	۲۸
۸۹/۹/۱	۲۰ میلی لیتر برای	-	گندم	سیاهک آشکار	بایرا آ گ	FS	%۴۰	لاماردور	پروتیوکونازول + تبوکونازول	

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا خرداد ماه ۱۳۹۹

	یکصد کیلوگرم بذر										
۹۶/۴/۱۹	۱۵ میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	-	جو	سیاهک آشکار	باير آ گ	FS	%۴۰	لاماردور	پروتیوکونازول + تبوکونازول		
۹۲/۷/۸	۳ لیتر در هکتار در مزروعه به صورت شنی در گلخانه به منظور ضد عفونی حاک جهت کنترل عامل بیماری فوق به مقدار ۰/۳ لیتر در هر متر مکعب خاک به صورت مخلوط با حاک	۳ روز	خیار	بوته میری	باير آ گ	SL	%۸۴	پرویکور انرژی	پروپامو کارب هیدرو کلراید و فوزتیل آلومینیوم	۲۹	
۹۲/۸/۲۷	۲ در هزار	۱ روز	خیار - گلخانه	سفیدک داخلی	باير آ گ	SC	%۶۸/۷۵	اینفینیتو	پروپامو کاب هیدرو کلراید + فلوبیکولید	۳۰	
۹۴/۷/۶	۱/۲ لیتر در هکتار	۷ روز	سیب زمینی	سفیدک داخلی	باير آ گ	SC	%۶۸/۷۵	اینفینیتو	پروپامو کارب هیدرو کلراید + فلوبیکولید		
۹۴/۷/۶	۲/۵ لیتر در هکتار	-	سیب زمینی	سفیدک داخلی	اگریفار	SC	%۴۵	پروکسانیل	پروپامو کارب هیدرو کلراید + سیموکسانیل	۳۱	
۹۶/۱۱/۳۰	۱ در هزار در زمان کشت بذر و انتقال نشا و ۰/۷۵ در هزار دو هفته پس از انتقال	-	خیار	بوته میری <i>Pythium aphanidermatum</i>	اگریفار	SL	% ۷۲/۲	پروپلنت	پروپامو کارب هیدرو کلراید	۳۲	

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا خرداد ماه ۱۳۹۹

	نها									
۹۷/۱۲/۱۳	نیم لیتر در هکتار		گندم	زنگ زرد	ب آ اس اف	EC	%۳۵/۵	اینور	پروپیکونوازول+فلوکسایپروکساد+پیراکلواستروبین	۳۳
۹۲/۸/۲۷	۰/۹ گرم در هر متر مربع	-	قارچ خوارکی	پوسیدگی خشک	فرتی اگرو	WP	%۵۰	آکورد	پروکلراز	۳۴
۸۶/۲/۳	۱/۲۵ در هزار (ضد عفونی بذر)	-	سیب زمینی	شانکر ریزوکتونیایی ساقه و شوره سیاه غده	بایرآگ	WP	%۲۵	مونسنرن	پنسیکرون	۳۵
۹۷/۱۰/۱۷	۰/۳۵ در هزار(بیش از سه نوبت متوالی و بیش از شش نوبت در یک دوره تولید ممنوع است).	-	خیار(گلخانه)	سفیدک کرکی	جیانگ سوگرین سای(برزگر بر جسته)	DF	%۱۸/۷	پیرادیم	پیراکلواستروبین+دیتمومورف	۳۶
۹۸/۱۰/۲۳	یک در هزار		گوجه فرنگی (مزرعه)	سفیدک پودری	بازرگانان سرای سپند پارس	WG	%۳۸	یونیلیس	پیراکلواستروبین + بوسکالید	۳۷
۹۸/۱۱/۲۸	یک در هزار و در تناوب با سایر قارچ- کشها و حداکثر دوبار در سال	-	توت فرنگی گلخانه	کپک خاکستری	گیاه پرنیان اطلس (Safa Tarim)	SC	%۳۰	میلیس	پیری متانیل	۳۸
۹۴/۳/۱۱	۱ لیتر در هکتار	-	ساقه کلزا	پوسیدگی اسکلروتنیایی	بایرآگ	EW	%۲۵	فولیکور	تبوکونازول	۳۹

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا خرداد ماه ۱۳۹۹

۹۵/۹/۲۹	۵۰ میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	-	گندم	سیاهک پنهان معمولی	بیسترفیلد	FS	%۶	آرتمیس	تبوکونازول	۴۰
۹۷/۱۲/۱۳	یک لیتر در هکتار	-	گندم	زنگ زرد	گل سم گرگان (نینگ بوسانجوی)	EW	%۲۵	تبوکور	تبوکونازول	۴۱
۹۷/۱۲/۱۳	۴/ لیتر در هکتار	-	گندم	زنگ زرد	گیاه پرنیان اطلس (تایید کرایپساینس)	SC	%۴۰	تایدتیو	تبوکونازول	۴۲
۸۸/۸/۱۱	۰/۵ لیتر در هکتار در مزرعه و ۰/۴ در هزار در گلخانه	۳ روز	جالیز	سفیدک پودری	ایزاگرو	EC	%۱۰	دومارک	تبوکونازول	۴۳
۹۲/۳/۲۷	۰/۳ در هزار	۱۴ روز	سیب	سفیدک پودری	ایزاگرو	EC	%۱۰	دومارک	تبوکونازول	
۸۹/۱۰/۱۳	۱۰۰ میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	-	گندم	سیاهک آشکار	ایزاگرو	LS	%۱۲/۵	لوسپل	تبوکونازول	۴۴
۸۹/۱۰/۱۳	۳۰ میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	-	گندم	سیاهک پنهان	ایزاگرو	LS	%۱۲/۵	لوسپل	تبوکونازول	
۹۸/۱۰/۲۳	یک در هزار	رژ	سفیدک پودری	آریاشیمی (Ningbo Sunjoy + Jiangsu)	SC	%۳۲	آدیلون	تبوکونازول + آزوكسی استروبین		۴۵

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا خرداد ماه ۱۳۹۹

۹۰/۷/۴	۰/۸-۱ لیتر در هکتار	۰/۸-۱ روز	۲۱ چغندر قند	سفیدک پودری	ایزاگرو	ME	%۱۲/۵	امی ننت	تتراکونازول	۴۶
۸۹/۳/۱۰	۱۵۰ گرم برای یکصد کیلوگرم بذر	-	جو	سیاهک آشکار	باير آگ	DS	%۷/۵	بایتان	تریادیمنول	۴۷
۸۹/۳/۱۰	۲۰ میلی لیتر برای ضد عفونی یکصد کیلوگرم بذر	-	جو	سیاهک آشکار	ب آ اس اف	FS	%۲۰	رئال	تری تیکونازول	۴۸
۸۸/۸/۱۱	۲۰۰ گرم در هکتار	۱ روز	- جالیز- مزرعه	سفیدک پودری	باير آگ	WG	%۵۰	فلینت	تری فلوكسی استروبين	۴۹
۹۶/۵/۲	۲۵۰ گرم در هکتار	۱ روز	- گوجه فرنگی- مزرعه	سفیدک پودری	باير آگ	WG	%۵۰	فلینت	تری فلوكسی استروبين	
۹۲/۳/۶	۱۶۰ گرم در هکتار	۲۱ روز	برنج	بلاست	باير آگ	WG	%۷۵	ناتیوو	تری فلوكسی استروبين + تبوکونازول	۵۰
۹۴/۵/۱۲	۰/۲۰-۰/۳ در هزار	۱۴ روز	سیب	لکه سیاه	باير آگ	WG	%۷۵	ناتیوو	تری فلوكسی استروبين + تبوکونازول	
۹۵/۶/۱	۰/۳ در هزار	۱۴ روز	سیب	سفیدک پودری	باير آگ	WG	%۷۵	ناتیوو	تری فلوكسی استروبين + تبوکونازول	
۹۵/۶/۱	۲۰۰ گرم در هکتار	-	چغندر قند	سفیدک پودری	باير آگ	WG	%۷۵	ناتیوو	تری فلوكسی استروبين + تبوکونازول	
۹۶/۹/۱۳	۱۶۰ گرم در هکتار	۲۱ روز	برنج	شیت بلایت	باير آگ	WG	%۷۵	ناتیوو	تری فلوكسی استروبين + تبوکونازول	
۹۸/۱۱/۱۴	۱۶۰ گرم در هکتار	-	برنج	بلاست	بازرگانان سرای سپند	WG	%۷۵	فلونازول	تری فلوكسی استروبين + تبوکونازول	۵۱

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا خرداد ماه ۱۳۹۹

					پارس (CAC Nantong)						
۹۸/۱۱/۱۴	۱۶۰ گرم در هکتار	-	برنج	بلاست	پاک سم ایرانیان Sunjo& CAC (Nantong)	WG	%۷۵	تیلما	تری فلوکسی استروبین + تبوکونازول	۵۲	
۹۶/۲/۲۵	۰/۰ در هزار	۱۴ روز	سیب	سفیدک پودری	بایر آگ	SC	%۵۰	لونا سن سیشن	تری فلوکسی استروبین + فلوپیرام	۵۳	
۹۶/۳/۱	۰/۰ در هزار	۱۴ روز	سیب	لکه سیاه	بایر آگ	SC	%۵۰	لونا سن سیشن	تری فلوکسی استروبین + فلوپیرام		
۹۶/۳/۱	۰/۰ در هزار	۳ روز	خیار- گلخانه	سفیدک پودری	بایر آگ	SC	%۵۰	لونا سن سیشن	تری فلوکسی استروبین + فلوپیرام		
۹۶/۵/۲	۰/۰ میلی لیتر در هکتار	۵ روز	گوجه فرنگی- مزرعه	سفیدک پودری	بایر آگ	SC	%۵۰	لونا سن سیشن	تری فلوکسی استروبین + فلوپیرام		
۹۶/۱۱/۳۰	۰/۰ در هزار	-	بادام	لکه آجری	سومیتومو	DC	%۱۹	ساپرول	تریفورین	۵۴	
۹۸/۱۲/۲۸	۰/۰ تا نیم در هزار	-	گندم	سیاهک پنهان معمولی	ب آ اس اف	FS	%۱۲	اینشورپرفرم	تریتیوکونازول + پیراکلواستروبین	۵۵	
۸۰/۳/۲۱	-	-	مرکبات	انبارداری	---	WAX	%۰/۷	سیترازول آ	تیابندازول + ایمازالیل	۵۶	
۹۰/۳/۳۰	۰/۰ کیلوگرم در هکتار	۲۱ روز	برنج	بلاست برگ و خوش	نیپون سودا ژاپن	WP	%۷۲/۵	ویستا	تیوفانات متیل + تری سیکلازول	۵۷	
۹۷/۶/۲۷	۰/۰ میلی لیتر در	-	گندم	زنگ زرد	ب آ اس اف	SC	%۴۷/۹	رکس دو	تیوفانات متیل + اپوکسی کونازول	۵۸	

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا خرداد ماه ۱۳۹۹

	هکتار									
۸۹/۳/۱۰	۲۰۰ میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	-	جو	سیاهک آشکار	سینجنتا	FS	%۳/۶۳	دیویدند استار	دیفنوکونازول + سایپرو کونازول	۵۹
۸۹/۹/۱	۱۰۰ میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	-	گندم	سیاهک آشکار	سینجنتا	FS	%۳/۶۳	دیویدند استار	دیفنوکونازول + سایپرو کونازول	
۹۷/۸/۱۴	۱ در هزار (عدم کاربرد بیش از دو نوبت در طول یک فصل)	-	خیار در شرابیط گلخانه‌ای	سفیدک پودری	سینجنتا	DC	%۱۴	سیدلی تاپ	دیفنوکونازول + سیفلوفنامید	۶۰
۹۴/۱۲/۱۰	۲ لیتر در هکتار	۳ روز	گوجه فرنگی	آلترناریا	ب آ اساف	EC	%۱۱/۲	کابریو دو	دیمتومورف + پیراکلوستروبین	۶۱
۹۴/۸/۲۵	۲ کیلوگرم در هکتار	۷ روز	سیب زمینی	سفیدک داخلی	ب آ اس اف	WG	%۶۹	آکروبات ام زد	دیمتومورف + مانکوزب	۶۲
۹۴/۳/۱۱	۱ لیتر در هکتار	-	ساقه کلزا	پوسیدگی اسکلروتینیایی	سینجنتا	SC	%۴۲	آلتو کمبی	سایپروکونازول + کاربندازیم	۶۳
۹۱/۳/۸	۰/۴-۰/۵ در هزار	۳ روز	خیار- گلخانه	سفیدک داخلی	ایشیهارا	SC	%۴۰	رانمن	سیازوفامید	۶۴
۹۴/۷/۶	۱۵۰ میلی لیتر در	-	سیب زمینی	سفیدک داخلی	ایشیهارا	SC	%۴۰	رانمن	سیازوفامید	

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا خرداد ماه ۱۳۹۹

	هکتار										
۹۶/۵/۲	۱/۵ در هزار	۳ روز	خیار- گلخانه	سفیدک داخلی	ایشیهارا	SC	٪۱۰	رانمن	سیازوفامید		
۹۷/۱۰/۱۷	۰/۶ در هزار(بیش از سه نوبت متوالی و بیش از شش نوبت در یک دوره تولید من نوع است).	-	خیار(گلخانه)	سفیدک کرکی	شاندوگ هایلر (بازرگانان سرای سپند پارس)	SC	٪۲۰	رگنانت	سیازوفامید	۶۵	
۹۲/۴/۱۷	۳ کیلوگرم در هکتار	۱ روز	خیار	سفیدک پودری	بیسترفیلد	WG	٪۸۰	سولفولاک	سولفور	۶۶	
۹۲/۸/۲۷	۲/۵ در هزار	-	انگور	سفیدک پودری	سمیران	SC	٪۸۰	گوگرد سمیران	سولفور	۶۷	
۹۳/۶/۱۰	۳/۷۵ در هزار	۲۰ روز	شلیل	سفیدک پودری	ارکیده سازان	SC	٪۴۰	سولفور ارکیده سازان	سولفور	۶۸	
۹۹/۳/۱۲	۳ در هزار با مشاهده اولین علائم و در تناوب با سایر قارچ- کش ها	-	خیار گلخانه	سفیدک پودری	آریا شیمی (کرومائل)	DF	٪۸۰	پارومی دی	سوافور	۶۹	
۹۸/۱۰/۹	۳ در هزار	-	توت فرنگی	کپک خاکستری	رهروان رویش سبز	SP	٪۶۲/۲	سراکوئینت	سولفات مس ۱۰۲ + فسفیت پتابسیم ۵۱۹	۷۰	
۹۷/۱۲/۱۳	۴ کیلوگرم در هکتار(مزرعه)	-	پیاز	سفیدک دروغی	خرز سم کود Zhejiang Segal	WG	٪۵۲/۵	اکولایزر	فاموکسادون + سیموکسانیل	۷۱	

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا خرداد ماه ۱۳۹۹

۹۹/۴/۹	در هزار ۲/۵	روز ۱۴	انگور	سفیدک سطحی	الیت ساوان (AGRO OAT)	EC	%۵	گاتن	فلوتیانیل	۷۲
۹۷/۱۰/۱۷	۳ لیتر در هکتار(در تناوب با قارچ کش های رایج)	-	سنبله گندم	فوازایومی	جیانگ سو (کیمیا سبزینه پویا)	SC	%۲۵	لیانگدی	فناماکریل	۷۳
۹۲/۱۲/۵	در هزار ۲/۵	روز ۳۰	پسته	گموز	شاندونگ داچنگ	WG	%۸۰	الیت	فروتیل آلومینیوم	۷۴
۹۶/۵/۲	۲ در هزار	روز ۱۴	مرکبات	گموز	دوگال	WP	%۸۰	رودر	فروتیل آلومینیوم	۷۴
۹۵/۸/۲۴	۲-۲/۵ در هزار بسته به شدت بیماری در سه نوبت	۷ روز	انگور	سفیدک داخلی	باير آ گ	WG	%۷۱/۱	پروفایلر	فروتیل آلومینیوم + فلوپیکولید	۷۵
۸۷/۵/۲	۰/۰ در هزار	۴ روز	کدوئیان	سفیدک پودری	ب آ اس اف	WG	%۵۰	استروبوی	کروزکسیم متیل	۷۶
۹۸/۴/۱۰	نیم در هزار	-	خیار(گلخانه و فضای باز)	بوته میری	پروبیلت فیتو اسپانیا (سما کوشانش)	SL	%۳۷/۵	بلتانول	کینوسول	۷۷
۹۷/۱۰/۱۷	۰/۰ در هزار(استفاده بیش از دو نوبت متوالی و بیش از چهار نوبت در یک دوره تولید منوع است.	۱ روز	خیار(گلخانه)	سفیدک کرکی	سینجنانتا	SC	۵۰	کاریال استار	ماندی پروپامید + دیفنوکونازول	۷۸

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا خرداد ماه ۱۳۹۹

۹۳/۴/۲	۳۰ گرم در یک لیتر آب و کاربرد به روش رنگ آمیزی	-	مرکبات	گموز	ماسو	WP	%۶۵	آلادوسی تی ال	مانکوزب + کلروتالونیل + سیمو کسانیل	۷۹
۹۷/۹/۲۶	۳/در هزار (به صورت تناوبی با قارچ کش های دیگر)	-	سبب درختی	لکه سیاه	ناگارجونا اگری کم (سبزمحصول داتیس)	WP	%۴۰	آئیس	مایکلوبوتائیل	۸۰
۸۶/۸/۲۸	یک بسته ۷ گرمی برای نگهداری ۵ کیلوگرم انگور	-	انگور	بیماریهای قارچی	اروم زرین خوش	پد کاغذی	۷ گرم متا بیسولفیت	سولفور پد	متا بی سولفیت سدیم	۸۱
۹۶/۴/۱۹	۲ در هزار در مزرعه به صورت محلول ریزی پای بوته و در گلخانه به منظور ضد عفونی خاک جهت کنترل عامل بیماری فوق به مقدار ۲۰۰ گرم در هر متر مکعب خاک به صورت مخلوط با خاک	۷ روز	خیار	بوته میری در مزرعه و گلخانه	گیاه	WP	%۷۲	داونی جی	متالاکسیل + مانکوزب	۸۲
۹۳/۲/۱۵	۲ در هزار در مزرعه به صورت محلول ریزی پای بوته و در گلخانه به منظور ضد عفونی خاک جهت کنترل	۷ روز	خیار	بوته میری در مزرعه و گلخانه	بهاور شیمی	WP	%۷۲	رزالاکسیل	متالاکسیل + مانکوزب	۸۳

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا خرداد ماه ۱۳۹۹

	عامل بیماری فوق به مقدار ۲۰۰ گرم در هر متر مکعب خاک به صورت مخلوط با خاک									
۹۴/۷/۶	۳ کیلوگرم در هکتار	۷ روز	سیب زمینی	سفیدک داخلی	بهارو شیمی	WP	%۷۲	رزاکسیل	متالاکسیل + مانکوزب	
۹۹/۳/۱۲	۲/۵ کیلوگرم در هکتار		سیب زمینی	سفیدک کرکی	کیمیا گوهر خاک (Leeds)	WP	%۷۲	منکوماکسیل	متالاکسیل ۸ درصد + مانکوزب ۶۴ درصد	۸۴
۹۵/۶/۲۹	۳-۴ در هزار	صفر روز	خیار- گلخانه	سفیدک داخلی	J I Biotech	SL	%۵۳	فسفایت	مونو و دی پتاسیم اسیدفسفونیک	۸۵
۹۵/۱۰/۲۷	قبل از انتقال نشاء یک در هزار، یک هفته بعد از انتقال نشاء دو در هزار و دو هفته پس از سمپاشی دوم به مقدار ۲ در هزار	۱۰ روز	گوجه فرنگی	پژمردگی فوزاریمی	Mitsui	SL	%۳۰	تاجی گارن	های مکساژول	۸۶
۹۸/۴/۱۰	۱/۵ لیتر در هزار لیتر آب	-	خیار(گلخانه) و فضای باز)	بوته میری	سینجنانتا	EC	%۴۴/۶	یونیفورم	مفتوکسام + آزوکسی استروبین	۸۷

قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا خرداد ماه ۱۳۹۹

۹۶/۸/۲۹	مزرعه: ۱۰ در هزار گلخانه: ۷/۵ در هزار	-	خیار	سفیدک پودری	JH.biotech	SL	-	میلدی کیور	عصاره گیاهی	۸۸
---------	--	---	------	-------------	------------	----	---	------------	-------------	----